

1032	核准日期：2019年12月30日 修订日期：2021年04月06日，2021年11月26日， 2022年10月17日，2025年05月22日， 2025年07月30日，2026年05月14日， 2026年06月23日	
	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）说明书 请仔细阅读说明书并在医师指导下使用	
	【药品名称】 通用名：双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌） 商品名：馨可宁（Cecolin） 英文名：Recombinant Human Papillomavirus Bivalent (Types 16,18) Vaccine (Escherichia coli) 汉语拼音：Shuangjia Ren Rutouliu Bingdu Yimiao (Dachang'aixijun)	
	【成分和性状】 本品系由大肠埃希菌表达的重组人乳头瘤病毒（Human Papillomavirus, HPV）16和18型的L1结构蛋白经纯化、重组装成病毒样颗粒（VLP），加入铝佐剂制成。	
	活性成分：_	
	每剂量（0.5ml）含：	
	重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白	40μg
	重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白	20μg
	辅料：_	
	氢氧化铝佐剂、氯化钠、二水合磷酸二氢钠、二水合磷酸氢二钠、聚山梨酯80、注射用水。 本品不含防腐剂和抗生素。	
1032	性状：_	
	0.5ml注射用混悬液，装于西林瓶中或预灌封注射器中。本品静置时可分层形成无色上清液和白色沉淀，摇匀后呈混悬液。	
	【接种对象】 本品适用于9-45岁女性。 目前尚未证实本品对已感染疫苗所含HPV型别病毒的人群有预防疾病的效果。随着年龄增长暴露于HPV的风险升高，特别是随着性生活开始后暴露于HPV的风险更为显著，因此建议尽早接种本品。因此在9-45岁年龄范围的低龄人群接种本品的获益会提高。	
	【作用和用途】 本品适用于预防因高危型人乳头瘤病毒（HPV）16、18型所致下列疾病（详见【临床试验】）： • 宫颈癌 • 2级、3级宫颈上皮内瘤样病变（CIN2/3）和原位腺癌（AIS） • 1级宫颈上皮内瘤样病变（CIN1） 以及HPV16型、18型引起的持续感染。	
	【规格】 西林瓶装：每瓶0.5ml，每1次人用剂量为0.5ml（含rHPV16蛋白40μg，rHPV18蛋白20μg）。 预灌封注射器装：每支0.5ml，每1次人用剂量为0.5ml（含rHPV16蛋白40μg，rHPV18蛋白20μg）。	
	【免疫程序和剂量】	
	1. 本品推荐于0、1和6月分别接种1剂次，共接种3剂，每剂0.5ml。 根据本品临床试验结果，第2剂可在第1剂之后的1~2月内接种，第3剂可在第1剂后的第5~8月内接种。 2. 根据本品临床试验结果（详见【临床试验】），对9-14岁女性也可以选择采用0、6月分别接种1剂次（间隔不小于5个月）的免疫程序，每剂0.5ml。 3. 目前尚未确定本品是否需要加强免疫。	
	接种说明： • 本品肌肉注射，首选接种部位为上臂三角肌。尚无本品皮下接种的临床研究数据；禁止进行血管内或皮内注射。 • 本品使用前应充分摇匀，摇匀后为白色均质混悬液。 • 每名接种者必须使用单独的无菌注射器和针头。 • 自冷藏容器中取出本品后，应尽快接种。 本品西林瓶或预灌封注射器有裂纹、标签不清或失效者、疫苗外观出现异常者均不得使用。	
	【不良反应】 按照国际医学科学组织委员会（CIOMS）推荐的发生率表示：十分常见（≥10%），常见（1~10%，含1%），偶见（0.1~1%，含0.1%），罕见（0.01~0.1%，含0.01%），十分罕见（<0.01%），对本品不良反应进行如下描述： (1) 本品临床试验 汇总本品中国境内开展的Ⅱ期、Ⅲ期和桥接研究共3个临床试验，共有4316名18-45岁和754名9-17岁女性受试者接种本品。观察并记录受试者接种本品后在现场30分钟的即时反应；收集每剂次接种后30天内不良反应/事件发生情况，以及观察期内（66个月）的全部严重不良事件。观察到下列征集性和非征集性不良反应： 全身不良反应 十分常见：发热（≥37.1℃）。 常见：头痛、乏力、咳嗽、肌肉痛、恶心、腹泻、头晕、呕吐。 偶见：超敏反应、过敏性皮炎、皮疹、眩晕、瘙痒症。	
	局部不良反应 十分常见：注射部位疼痛。 常见：注射部位瘙痒、硬结、肿胀、红斑。 偶见：注射部位皮疹、不适。 以上大部分不良反应程度为轻至中度。	
	(2) 同类产品境内外临床试验 除本品上述临床试验中报告的不良反应外，其他同类产品 在境内外临床试验中还观察到如下不良反应： 全身不良反应：耳痛、流涕、鼻塞、口咽疼痛、咽喉刺激、喉部疼痛、呼吸困难、口腔疱疹、胃肠炎、鼻咽炎、感觉减退、偏头痛、震颤、肌肉骨骼强直、肌无力、肢体疼痛、颈痛、背痛、鼻充血、失眠、注射恐惧、易激惹、荨麻疹、玫瑰糠疹、多汗、冷汗、出汗不良性湿疹、口渴、腋痛、寒战、流感样症状、子宫不规则出血、痛经、月经量少、月经不调、口腔溃疡、消化不良、腹痛、便秘、牙疼、潮热、淋巴结病、眼睑水肿、关节痛、嗜睡。 局部不良反应：注射部位发热、瘀青、出血、血肿、丘疹、感觉异常、瘢痕。	
	(3) 同类产品境内外上市后监测 3.1 本品上市后监测 除了本品上述临床试验中报告的不良反应以外，在上市使用后自发报告了以下不良事件。由于这些事件来自数	
	量难以确定的人群的自发报告，无法准确地估计其发生频率或确定其与本品接种之间的因果关系。 各类神经系统疾病：嗜睡。 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病：关节痛。 免疫系统疾病：血管性水肿。 全身性疾病及给药部位各种反应：胸部不适。 心脏器官疾病：心悸。 3.2 同类产品上市后监测 除上述安全性信息外，同类产品 在境内外上市使用后自发报告了以下不良事件，由于这些事件来自数量难以确定的人群的自发报告，无法准确地估计其发生频率或确定其与疫苗接种之间的因果关系。 免疫系统疾病：支气管痉挛。 各类神经系统疾病：晕厥或血管迷走神经反应（有时还伴有强直-阵挛性发作）、急性播散性脑脊髓炎（ADEM）（发生在接种后数天至2周左右，有可能会	
	出现发热、头痛、惊厥、运动障碍性疾病或意识障碍）、格林巴利综合征（表现为诸如从肢体远端开始的弛缓性麻痹、腱反射下降或消失）。 感染及侵袭类疾病：蜂窝织炎。 全身性疾病及给药部位各种反应：外周肿胀、胸痛。 皮肤及皮下组织类疾病：过敏性紫癜。 血管及淋巴类疾病：苍白。 生殖系统及乳腺疾病：阴道分泌物、阴道出血、乳头病 痛。 血液及淋巴系统疾病：原发性血小板减少性紫癜。	
	【禁忌】 1. 对本品中任一活性成分或辅料严重过敏反应者。 2. 注射本品后有严重过敏反应者，不应再次接种本品。	
	【注意事项】 1. 疫苗接种不能取代常规宫颈癌筛查，也不能取代预防HPV感染和性传播疾病的其他措施。因此，按照卫生行政相关部门建议常规进行宫颈癌筛查仍然极为重要。 2. 接种本品前医疗人员应询问和审阅受种者的病史（尤其是既往接种史和先前是否发生过与疫苗接种有关的不良反应）并进行临床检查，评估接种本品的获益与风险。本品不推荐用于该说明书【接种对象】以外人群。 3. 与其他注射用疫苗一样，需准备适当的医疗应急处理措施和监测手段，以保证在接种本品后发生过敏反应者能够及时得到处置。 4. 晕厥反应：任何一剂疫苗接种后可能会出现晕厥（昏厥），导致跌倒并受伤，尤其是在青少年及年轻成人中。因此，建议接种本品后按接种规范要求现场留观至少30分钟。据报道，国外接种同类疫苗后可能会出现与强直-阵挛性发作和其他癫痫样发作有关的晕厥。强直-阵挛性发作有关的晕厥通常为一过性，保持仰卧体位或头低脚高体位，待脑灌注恢复后症状自行消失。部分受种者可能在接种前/后出现心因性反应，需采取措施以避免晕厥造成的伤害。 5. 与其他疫苗一样，在受种者患有急性严重发热疾病时应推迟接种本品。若当前或近期有发热症状，是否推迟疫苗接种主要取决于症状的严重性及其病因。仅有低热和轻度的上呼吸道感染并非接种的绝对禁忌。 6. 受种者为血小板减少症患者或者任何凝血功能紊乱患者时应谨慎使用本品。 7. 与任何其他疫苗一样，接种本品可能无法确保对所有接种者均产生保护作用。 8. 本品仅用于预防用途，不适用于治疗已经发生的HPV相关病变，也不能防止病变的进展。 9. 本品不能预防所有高危型HPV感染所致病变。尚未证	

实本品能预防疫苗所含型别以外的其他HPV感染导致的病变以及非HPV引起的疾病。

10. 本品尚无在免疫系统受损者（例如使用免疫抑制剂）中使用的数据。与其他疫苗一样，免疫力低下人群接种本品可能无法诱导充分的免疫应答。

11. 目前尚未完全确定本品的最长保护期。在本品Ⅲ期临床试验中，对病理高度病变（CIN2/3和AIS等）的保护效力随访66月（中位时间：68.7月），中和抗体持久性研究随访66月（中位时间：69.4月），具体结果详见【临床试验】。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠：

1. 目前尚未进行独立研究系统评估本品对妊娠期妇女的影响。在临床试验期间的极为有限数据（8例）显示妊娠期意外接种本品并未发生妊娠结局和新生儿健康状况的异常，也未发现接种本品后对妊娠率、妊娠结局和新生儿健康状况的不良影响。但这些数据尚不足以判断妊娠妇女接种本品后是否导致发生不良妊娠（包括自然流产）的风险。
2. 动物实验中没有发现接种本品对生殖、妊娠、胚胎/胎儿发育、分娩或出生后发育造成直接或间接的不良影响。
3. 妊娠期间应避免接种本品。若女性已经或准备妊娠，建议推迟或中断接种程序，妊娠期结束后再进行接种。

哺乳期妇女：

本品尚无相关研究数据。由于许多药物可经母乳分泌，因此，哺乳期妇女应慎用。

【药物相互作用】

1. 由于国内尚未进行本品与其他疫苗联合接种的临床试验，目前尚无本品与其他疫苗同时接种的研究数据。
2. 接种本品前三个月内避免使用免疫球蛋白或血液制品。
3. 尚无临床证据显示使用激素类避孕药是否会影响本品的预防效果。
4. 与其他疫苗一样，免疫力低下人群接种本品可能无法诱导充分的免疫应答。与免疫抑制药物同时使用可能不会产生最佳的主动免疫应答。
5. 目前尚无临床数据支持本品与其他HPV疫苗互换使用。
6. 由于缺乏配伍禁忌研究，本品禁止与其他医药产品混合注射。

【临床试验】

中国境内已完成本品的3项临床试验（表1），在9-45岁女性人群中评价了接种3剂本品的保护效力、免疫原性（包括9-14岁部分儿科人群接种2剂）和抗体持久性。

表1. 境内9-45岁女性人群的主要临床研究汇总

研究序号	分期	研究设计	受试者例数*	受试者人群
HPV-PRO-002	Ⅰ期	随机双盲、安慰剂对照免疫原性试验	1600例	18-25岁女性
HPV-PRO-003	Ⅲ期	随机双盲、安慰剂对照、多中心保护效力试验（包括免疫原性/持久性）	7372例	18-45岁女性
HPV-PRO-006	桥接	随机、对照免疫原性试验	979例	9-26岁女性

* 入组并至少接种1针的受试者。

1. 保护效力试验结果

在本品HPV-PRO-003保护效力试验中，共入组7372名18-45岁女性，随访至第66月（中位时间68.7月）时，本

品在符合方案集（PPS）人群中对主要临床终点HPV16和/或18相关的CIN2/3、AIS或宫颈癌的保护效力为100.0%（95%CI: 67.2, 100.0），预防与HPV16和/或HPV18相关的不同疾病终点的效力见表2。

表2. 本品对18-45岁女性人群不同疾病终点的保护效力汇总（PPS人群*）

研究终点	本品		对照（戊肝疫苗）		保护效力% (95%置信区间)
	N	病例数	N	病例数	
HPV 16和/或18型感染相关的高度癌前病变（CIN2/3或AIS）	3281	0	3267	13	100.0 (67.2, 100.0)
HPV 16和/或18型感染相关的癌前病变（CIN1/2/3或AIS）	3281	0	3267	20	100.0 (79.8, 100.0)
HPV 16和/或18型持续性感染（6月以上）	3233	2	3237	70	97.2 (89.4, 99.7)
HPV 16和/或18型持续性感染（12月以上）	3207	2	3205	50	96.0 (84.9, 99.5)

注：N=被纳入分析的受试者人数。

* PPS人群须同时满足下列条件：在入组后完成全部3剂疫苗接种；无重大方案违背；在试验入组当天疫苗接种相关HPV型别中和抗体阴性并且试验入组当天至末次疫苗接种后1个月对同一HPV型别DNA检测均为阴性的受试者，且在末次接种后1个月后完成足以支持终点指标判定的妇科访视，从末次接种后1个月后开始评价保护效力。

2. 免疫原性结果

（1）18-45岁女性人群的免疫原性结果

在HPV-PRO-003效力试验中，免前对应型别中和抗体阴性且全程接种了3针试验疫苗的受试者中，其首针免后7个月、42个月、66个月的中和抗体结果见表3。

表3. 18-45岁女性免疫原性结果*（PPS人群*）

时间	HPV 16			HPV 18		
	阳性数/ 观察数	阳性率% (95%置信区间)	GMC(IU/ml) (95%置信区间)	阳性数/ 观察数	阳性率% (95%置信区间)	GMC(IU/ml) (95%置信区间)
第7月	116/116	100.0 (96.9,100.0)	726.8 (638.5, 827.2)	125/125	100.0 (97.1, 100.0)	435.5 (378.0, 501.6)
第42月	111/111	100.0 (96.7,100.0)	75.5 (62.4, 91.3)	117/119	98.3 (94.1, 99.8)	35.4 (29.1, 43.1)
第66月	110/110	100.0 (96.7,100.0)	71.4 (59.5, 85.8)	118/120	98.3 (94.1, 99.8)	33.8 (27.7, 41.3)

* 表中采用中和抗体评价本品免疫原性，中和抗体检测方法为假病毒中和实验法（PBNA），采用英国国家生物制品检定所（NIBSC）的国际标准品进行定量，HPV16型和HPV18型中和抗体的阳性界值分别为2.1 IU/ml和1.7 IU/ml。

* PPS人群须同时满足以下条件：在入组后完成全部3剂疫苗接种；无重大方案违背；免前疫苗相关HPV型别中和抗体阴性；免前和首针免后7月对应型别HPV DNA检测均为阴性；首针免后7月完成有效的血清学访视；首针免后42月、66月完成至少一次有效的血清学访视。

（2）9-17岁女性人群的桥接试验免疫原性结果

在HPV-PRO-006桥接试验中包括9-14岁接种2针人群、9-17岁接种3针人群、18-26岁接种3针人群，相对于Ⅲ期试验中18-26岁人群，桥接试验中前述3个人群的中和抗体GMC均达到非劣效标准（GMC比值的95%CI下限大于0.5）。本品接种9-17岁人群的免疫持久性研究正在进行中。

表4. 9-17岁人群和Ⅲ期18-26岁人群的免疫原性结果（PPS人群*，首针免后7月，中和抗体）

变量	Ⅲ期		桥接			
	18-26岁*	N	9-14岁（2针组）	9-17岁（3针组）	N	18-26岁* N
阳转率%(95%CI)						
HPV16	100.0 (94.0, 100.0)	60	100.0 (98.7, 100.0)	291	100.0 (99.1, 100.0)	422 (98.0, 100.0)
HPV18	100.0 (94.3, 100.0)	63	100.0 (98.7, 100.0)	287	100.0 (99.1, 100.0)	424 (98.1, 100.0)
(GMC)(95%CI)						
HPV16	778.7 (658.3, 921.1)	60	1377.5 (1251.2, 1516.5)	291	1805.2 (1680.6, 1939.0)	422 (834.2, 1065.6)
HPV18	495.8 (402.4, 610.9)	63	708.1 (647.5, 774.4)	287	1335.3 (1228.1, 1451.7)	424 (530.6, 682.6)

* PPS人群须同时满足以下条件：在入组后按免疫程序完成全部的试验疫苗接种；无重大方案违背；免前相应HPV型别中和抗体阴性；首针免后7月完成有效的血清学访视。

* Ⅲ期与桥接试验中虽然同样是18-26岁人群由于受试者来自不同研究和不同地区，且具体年龄构成比不同（桥接试验中较小年龄人群18-22岁人群占比相对较多）。以上原因可能导致两者抗体GMC略有差异，但无统计学意义。

【贮藏条件】

避光冷藏储存于2℃-8℃。不得冻结，如发生冻结应予以废弃。

【包装】

0.5ml/瓶（西林瓶）：以0.5ml单剂量包装于西林瓶中，每盒1瓶。

0.5ml/支（预灌封注射器）：以0.5ml单剂量包装于预灌封注射器中，每盒1支。

【有效期】

36个月。

【执行标准】YBS00592026

【批准文号】国药准字S20190047

【上市许可持有人】

企业名称：厦门万泰沧海生物技术有限公司
注册地址：福建省厦门市海沧区山边洪东路50号一层
邮政编码：361027
电 话：0592—6536555
传 真：0592—6536567
服务热线：400-001-8508
网 址：http://www.innovax.cn

【生产企业】

企业名称：厦门万泰沧海生物技术有限公司
西林瓶包装形式生产地址：福建省厦门市海沧区山边洪东路52号、60号
预灌封注射器包装形式生产地址：福建省厦门市海沧区山边洪东路52号
邮政编码：361027
电 话：0592—6536555
传 真：0592—6536567
服务热线：400-001-8508
网 址：http://www.innovax.cn

0086V02